

Les DIS : Douleurs Induites par les Soins

Dr Lari . HAMOUDA

Présidente du CLUD

13^e colloque CH Henri GUERIN PIERREFEU DU VAR

23 mai 2024

JOURNEE MONDIALE DE LA DOULEUR

6e Colloque

Centre hospitalier Henri Guerin Pierrefeu-du-Var

les DIS



... tu connais ?

Lundi 17 octobre 2016
De 9h00 à 17h00
Galerie Henri Savio - Chalet



Conception : Christophe Marduel - Dessin : Marie-Catherine Auber 2016

JMD 2016 : Douleurs induites par les soins

Communication

Les DIS... Tu connais?

Dr L. HAMOUDA

Illustrations:

Mr JM CARTEREAU

Atelier d'Art

JOURNÉE MONDIALE DE LA DOULEUR

6^e Colloque Centre hospitalier Henri Guerin Pierrefeu-du-Var

les DIS



... tu connais ?

Lundi 17 octobre 2016

De 9h00 à 17h00

Galerie Henri Savio - Chalet



**2016 : Création pour la
Journée Mondiale de la
Douleur 6è Colloque**

**800 exemplaires
autofinancés par le
Comité d'organisation**

**ARS : Financement pour
3000 exemplaires par
l'ARS en 2022**





PROTOCOLE

Code :
CLUD/PRT-001

Version : 02

**Prévention de la douleur induite par les soins
Délai et durée d'action des antalgiques**

Date d'application:
06/2023

Page : 2/5

			5 mn	10 mn	15 mn	30 mn	45 mn	1h	1h15	1h30	1h45	2h	2h15	2h30	2h45	3h	4h	5h	6h	8h		
PALIER 1	Molécules	Spécialités	Voie																			
	PALIER 1	Paracétamol (P)	Doliprane, Dafalgan, Efferalgan	Per Os																		
formes effervescentes/orodispersibles			Per Os																			
Doliprane 1g			Suppo																			
Perfalgan 1g			IVL 15mn																			
Kétoprofène		Profénid 100mg	Per Os																			
			IVL 20mn																			
Ibuprofène	Advil, Nureflex... cp	Per Os																				
	Advil capsule molle	Per Os																				
PALIER 2	Codéine + P	efferalgan codéiné/ dafalgan codéiné	Per Os																			
	Tramadol + P	Zaldiar/Ixprim 37,5mg/325mg	Per Os																			
	Opium + P	Lamaline 10mg/300mg + caféine 30mg	Per os																			
		Lamaline 15mg/500mg + caféine 50mg	Suppo																			
	Tramadol	Contramal 50mg LI Topalgic 50mg LI	Per Os																			
			IVL																			
PALIER 3	Morphine LI	Actiskénan Sevredol	Per Os																			
		Oramorph solution buvable	Per Os																			
	Morphine	Morphine amp 10mg/ml	s/c																			
			IV																			
	Oxycodone LI	Oxynorm	Per Os																			
			IV																			

Légende :

■	On peut faire le soin / Maximum d'efficacité
■	Faible efficacité Début d'action Attendre
■	Absence d'efficacité / Ne pas faire le soin



PROTOCOLE

Code :
CLUD/PRT-001

Version : 02

**Prévention de la douleur induite par les soins
Délai et durée d'action des antalgiques**

Date d'application:
06/2023

Page : 4/5

ANTIDOTE	Molécule	Spécialité	Voie	2 mn	5 mn	10 mn	15 mn	30 mn	45 mn	1h	1h15	1h30	1h45	2h	2h15	2h30	2h45	3h	4h	5h	6h	
				Naloxone	Naloxone/Narcan 0,4mg/ml	IV																
Naloxone/Narcan 0,4mg/ml	IM																					
Naloxone/Narcan 0,4mg/ml	sous cut																					
Fiumazenil	Fiumazenil/ 1mg/10ml	IV		à renouveler toutes les minutes maximum 4 fois chez l'adulte																		

PEDIATRIE : Technique antalgique spécifique de 0 à 3 mois

Molécule	Spécialité	Voie	2 mn	5 mn	10 mn	15 mn	30 mn	45 mn	1h	1h15	1h30	1h45	2h	2h15	2h30	2h45	3h	4h	5h	6h
			Saccharose	solution buvable 24%/glucose 30%	Per Os				une 2 ^e administration peut être faite à la 5 ^{ème} minute											

Groupe de travail en cours pour réviser/réactualiser le protocole pour y inclure les nouveaux traitements avec AMM pour la prévention ex forme spray et comprimés sublingual de PIII

Protocole sera diffusé par le RDPO

*Pour nos patients,
résidents, usagers...*

